



ETURAUHASEN HÖYLÄYS (Tur-p)

- Yleistä** Teillä on todettu **eturauhasen liikakasvu** ja hoidoksi on valittu **eturauhasen höyläysleikkaus**. Eturauhanen (prostata) ympäröi virtsaputkea aivan virtsarakon alapuolella. Leikkauksella pyritään parantamaan virtsankulkua ja rakon tyhjenemistä.
- Kipu** Kivun hoitaminen leikkauksen jälkeen on **tärkeää** ja kipulääkettä on hyvä ottaa **alkuun säännöllisesti**, koska se edistää toipumistanne. Usein höyläysleikkauksen jälkeinen **kipu tuntuu ulostamisen ja/tai virtsaamisen tarpeena**. Kivun kokeminen on yksilöllistä ja on tärkeää, että osastolla ollessanne kerrotte henkilökunnalle, mikäli tunnette kipua.
- Kotiutus ja jatkohoito** **Leikkauksen** yhteydessä teille on laitettu **katetri virtsarakkoon**, jotta toimenpiteen aikana tulleet **verihyytymät** pääsevät **poistumaan** virtsarakosta. **Virtsa kirkastuu yleensä 1-2 päivässä ja katetri poistetaan**. Kotiin pääsette kun **virtsaaminen onnistuu normaalisti**. Rakko on aluksi ärtynyt, mikä voi aiheuttaa tiheää virtsaamistarvetta. Voimakkaan virtsauspakon vuoksi voi esiintyä vähäistä virtsan karkailua, mikä kuitenkin häviää pian. Veren- vuotoa voi esiintyä lisääntyvässä määrin uudelleen, kun ruvet irtaavat noin **kolmen viikon kuluttua** leikkauksesta. **Verenvuoto on vaaratonta ja lakkaa yleensä itsestään**.
- Katetrin poiston jälkeen osastolla otetaan yleensä **virtsanäyte**. Jos lääkäri katsoo antibiootihoidon aiheelliseksi, teille lähetetään lääkeresepti kotiin postitse jos ette ole saanut sitä osastolta kotiutuessanne.
- Leikkauksessa otetut **koepalat** menevät **patologin tutkittaviksi** ja valmistuvat **2-3 viikossa**. Tarvittavat jatkokontrolliajat saatte osastolta mukaan kotiutuessanne tai ne lähetetään kotiin kirjeitse.
- Ongelmatilanteissa** Mikäli teillä ilmenee joitain seuraavista oireista **leikkauksen jälkeen**; kova kuume, virtsaamisvaivoja, kuten runsasta verenvuotoa virtsan mukana tai virtsaaminen ei onnistu (virtsaumpitilanne) tai jos toimenpiteenne on tehty selkäydinpuudutuksessa ja teillä on sen jälkeen voimakasta päänsärkyä, mikä ei hennitä kipulääkkeillä ja levolla, **ottakaa tällöin yhteys teidät kotiuttaneeseen yksikköön tai akuuttiklinikalle**. Jos leikkauksesta on kulunut **useampia viikkoja**, ottakaa tällöin **ensisijaisesti yhteys oman kunnan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon**.

Yhteystiedot

Osasto 4B	040 149 1241
Leiko-osasto 2B	040 149 1257 (avoinna ma-pe klo 7-19)
Akuuttiklinikka	040 149 1191